

Bejagung des Rotwildes und Muffelwildes im Hinterlandswald

von Winfried Wagner, Rot- und Muffelwildsachkundiger im Rotwild- und Muffelwildgebiet Hinterlandswald



Ansprechhilfen

- Kleine Entscheidungshilfen
für Jäger mit weniger Wildkontakt
- Maßstäbe am Wild suchen
- Für klare Zuordnung

Was das Rotwild an Heu in den
Bauch bekommt, braucht es nicht
vom Wald zu nehmen!



Ansprechhilfen für Schmaltiere im Mai -> Körpergröße!



Schmaltier im Rudel


->auffallend ! -> Nachlese wichtig



Körperlicher Unterschied



Körperform



Einzelnes Schmaltier im Mai: hochläufig, kurzer gedrungener noch „Kälber-Kopf“



SchmalSPIEßer im Mai




Kalb hat gelernt, das die Mutter zu ihm kommt
und es abholt! -> Kalb sucht NICHT die Mutter!



Alttier, Anfang Mai mit Gesäuge

- Alttier führt
- ein Kalb
- welches in Deckung
- abgelegt ist.
- Das Kalb wartet dort
- IMMER auf das Alttier
- Alttier kommt immer
- zum Kalb



Schmalspießer im Mai, 4 cm Rosenstöcke, noch bejagbar



Schmaltier im Mai, sehr hochläufig,
mehr hoch als lang!



Im Mai, geringer SchmalSPIEßer
und Schmaltier, beide bejagbar



Im Mai: Alttier, Alttier, Kalb, Schmaltier



Bejagung des Kahlwildes!

Immer

Kalb vor Alttier!!!



Verwaistes Kalb nach Mutter-Abschuss! Verlassen
und verstoßen nach Mutter-Verlust! Völlig abgekommen
wird es wohl nicht überleben!



Schmalspießer im Mai



Schmaltier im Sommer (Ende Juli)



Alttier im Sommer



Schmaltier im Sommer




Alttier – Schmaltier im September



Ansprechhilfen für Hirsche

- Zusammenhang zwischen Alter und Stangenlänge
- Es besteht ein Zusammenhang zwischen:
- Stangenlänge und Alter!
- Vergleichsmaße am Körper suchen!

Schmalspießer mit 54 cm Stangenlänge -> bitte schonen!



SchmalSPIeßer, lauscherhoch



Schmalspießer 30 cm Spießlänge



Typischer Hirsch Klasse III



Vergleich Kopfmaße zu Stangenlänge



Achter vom 3.Kopf, Klasse III



6er Hirsch, 2jährig - Abschusshirsch




12er vom 3 / 4. Kopf



Junger starker Kronenhirsch mit
Kronenenden > 10 cm -> Bitte schonen!



Zwölfer, 3. Kopf



Junger 2. jähriger Kronenzehner



60 cm Stangenlänge

30 cm Gesicht-Länge

20 cm vom Windfang
bis zum Licht

2 jähriger gut veranlagter Kronenhirsch

Beisp.: unger. Achter in Klasse I und II sind im Rahmen der Iller Freigabe bejagbar



Mittelalter Hirsch, Klasse II, 5. Kopf



Spitzes schlankes Haupt -> mittelalter Hirsch, 5. Kopf!
-> bitte schonen!



Hirsch ca. 7. Kopf, noch gerade Rückenlinie
sehr gute körperliche Entwicklung! -> schonen!



Ansprechhilfen ältere Hirsche



35 cm Gesicht-Länge

12 jähriger Hirsch mit 1 m Stangenlänge

12 jähriger Hirsch mit breitem Haupt
mit tief und seitlich aufsitzenden Rosen.



9-10 jähriger Hirsch und 12 jähriger Hirsch



9-10 jähriger Hirsch und 12 jähriger Hirsch



Alter Hirsch mit starker Wamme, 12.Kopf



Alter Hirsch mit sehr starkem Träger



Alter Hirsch



Tief aufsitzende Stangen, breites Haupt,
massiger Vorderkörper und Träger -> alter Hirsch



Keine Jagdausübung im Umfeld von Fütterungen



Ansprech-Beispiele Muffelwild



Jährlingswidder



Ansprache über Zifferblatt einer Uhr



3 jähriger + 2 Jährlinge – jagdbar!



Junger Widder-> Grobe Schmuckringe

3 jähriger Widder mit groben Schmuckringen



5 jähriger C-Widder – Schonen!



6 jähriger Widder – feine Schmuckringe an der Basis



Alter 8 jähriger Widder mit engen Schmuckringen



Muffelwidder mit Rammmerkmalen an der Schneckenbasis



Moderhinke - Merkmale



Eingerollte Schalenränder durch Moderhinke



Muffel knien beim Äsen



Typische Einwachser – Scheuerer B-Widder



Muffel sind „Nestflüchter“



Kurz nach dem Setzen beginnt das Schaf bei dem Lamm mit der Analmassage, um das Lösen anzuregen

Erstes Horn mit 5 Wochen

*Muffelschaf und
Widderlamm im
typischen
Sommerhaar. Der
Horndurchbruch
erfolgt nach etwa
vier bis fünf
Wochen*



Widderlamm – gehörntes Schaf



Vorliebe für Salzlecken



Salzlecken üben auch auf Muffelwild eine große Anziehungskraft aus

Kapitaler Widder mit Brunftmähne



Ein starker
Muffelwidder
mit einer
typischen
und deutlich
ausgeprägten
Brunftmähne

Bejagungs-Empfehlung der RWHG-HLW 2021